

Avertissements agricoles



Bulletin n° 26 du 15 octobre 1986

Numérotation continue : n° 26

COLZA :

. Charançon du bourgeon terminal :
attention, quelques vols importants
signalés

CEREALES :


. Pucerons : début du vol, restez
vigilant

COLZA :**- Situation :**

Le colza possède souvent 6 à 7 feuilles. Deux insectes peuvent encore le menacer cet automne : **altises** et **charançons du bourgeon terminal**.

La présence des premiers est toujours très faible (1 ou 2 prises dans les cuvettes de temps à autre). Quant au second, le vol a débuté fin septembre dans quelques postes d'observations, principalement en Meuse et sur le plateau de Haye.

POSTES	Treveray 55	Abainville 55		Bréhéville 55	Chambley 54			Courcelles 57
DATES	03/10	01/10	05/10	28/09	01/10	03/10	07/10	06. 10
NOMBRE DE CAPTURES	2	1	1	4	20	3	16	1



Charançon du bourgeon terminal

La larve du charançon du bourgeon terminal est plus dangereuse que l'adulte.

Durant l'hiver, elle s'installe à l'extrémité de la tige et dévore le bourgeon terminal. A la reprise de végétation, le colza forme plusieurs tiges (aspect buissonnant).

La lutte contre la larve étant plus difficile à mettre en oeuvre, il est préférable de détruire les adultes à l'automne.

Imprimerie de la Station de ~~Sorbonne~~ NANCYDirecteur-Gérant ~~XXXXXXXXXX~~ D. VERBEKE

Publication Périodique :

CPPAP N° : ~~XXXXXX~~ 2011 ADAbonnement annuel : ~~XXXXXX~~ 150,00 F

MINISTÈRE DE L'AGRICULTURE

SERVICE REGIONAL DE LA PROTECTION DES VEGETAUX

Cité Administrative

54043 NANCY CEDEX

Tél : (8) 337.26.45.



P40

- Préconisations :

Surveillez l'apparition du charançon du bourgeon terminal dans vos parcelles et intervenez 10 à 15 jours après les premières captures. Les agriculteurs des secteurs cités dans le tableau doivent être particulièrement vigilants (Meuse, Plateau de Haye). Dans les autres régions, surveillez également l'arrivée des insectes dans les cuvettes jaunes.

Les insecticides appliqués contre l'adulte sont ceux utilisables pour le charançon de la tige : se reporter au tableau "Ravageurs du colza" joint à notre bulletin n° 23 du 03 septembre 1986.

Nota : Les parcelles traitées au semis avec un microgranulé ne sont protégées que durant une période de 8 semaines environ, aussi les vols survenant fin octobre devront faire l'objet d'une nouvelle protection.

CEREALES :

Les orges sont entre le stade 2 à 3 feuilles et début tallage ; les premiers blés commencent à lever et possèdent 1 à 2 feuilles.

Les pucerons sont actuellement présents dans de nombreuses parcelles en nombre limité : 0 à 10 % de pieds atteints.

Les journées actuelles chaudes favorisent leur activité et leur multiplication.

- Préconisations :

Surveillez régulièrement vos parcelles (1 fois par semaine au minimum) et attendez que 20 % de pieds soient porteurs de un ou plusieurs pucerons pour intervenir avec un des produits cités dans notre précédent bulletin.

